

# Una herramienta para el registro de pacientes en tratamiento con Kanbis®.




**Estado actual - Mayo 2024**

**790** pacientes registrados en Kanbis.io


## 75 pacientes con indicación en epilepsia




### Edades



### Distribución por sexo




### Diagnóstico



### Dosis utilizada (mg/kg/día)


Diagnóstico	Dosis MIN	Dosis MAX	Dosis MED
Epilepsia focal resistente al tratamiento	6	71	16
Epilepsia resistente no especificada	1	83	15
Síndrome de Lennox Gastaut	11	100	24
Crisis parciales migratrices de la infancia	2	6	4
Síndrome de Dravet	24	24	24
Encefalopatía epiléptica con ausencias	2	6	4
Complejo de esclerosis tuberosa	5	5	5
Síndrome de West	6	11	9
Otro	1	50	16

### Tratamiento concomitante



<sup>1</sup> Epilepsia mioclónica, multifocal, secundaria a TEC, punta onda continua del sueño lento (POCSL), encefalopatía epiléptica con espigas multifocales, síndrome epiléptico por infección febril (FIRES).

### Frecuencia de crisis mensual de los pacientes al inicio del tratamiento con Kanbis®



<sup>2</sup> Etosuximida, Rufinamida, Zonisamida, Brivaracetam, Clonazepam, Fenitoína, Gabapentina, Pregabalina.

23%

De los pacientes utilizó previamente Cannabis y derivados.



Los pacientes registrados utilizan entre 1 y 4 fármacos antiepilépticos concomitantemente.


# Una herramienta para el registro de pacientes en tratamiento con Kanbis®.




## 715 pacientes con indicaciones diferentes a epilepsia




### Edades



### Distribución por sexo




### Condiciones



### Dosis utilizada (mg/día)

Diagnóstico	Dosis MIN	Dosis MÁX	Dosis MED
Dolor crónico	5	1000	30
Trastorno de ansiedad	1	1000	25
Trastornos del sueño	10	800	30
Depresión	5	350	25
Trastorno del espectro autista	15	450	50
Adicciones	20	1000	100
Trastorno por estrés posttraumático	5	3600	25
Otras	10	500	40

### Tratamiento concomitante



<sup>3</sup> Enfermedad de Parkinson, TOC, burn-out, ELA, esclerosis múltiple, temblor esencial, tolerancia a la quimioterapia y psicosis.

<sup>4</sup> Los más comunes fueron Lorazepam, Gabapentín, Amitriptilina, Tramadol, Lamotrigina.

19%

De los pacientes utilizó previamente Cannabis y derivados.



Los pacientes registrados utilizan entre 1 y 7 fármacos concomitantemente.

+ info



¡Muchas gracias a todos los que participan en este registro!

Dirección de Asuntos Médicos / Gerencia de Farmacovigilancia