

# Una herramienta para el registro de pacientes en tratamiento con Kanbis®.




**Estado actual - Diciembre 2025**

**1624** pacientes registrados en Kanb.io


**140** pacientes con indicación en epilepsia




## Edades



## Distribución por sexo




## Diagnóstico



<sup>1</sup> Epilepsia mioclónica, multifocal, secundaria a TEC, punta onda continua del sueño lento (POCSL), encefalopatía epiléptica con espigas multifocales, síndrome epiléptico por infección febril (FIRES).

## Frecuencia de crisis mensual de los pacientes al inicio del tratamiento con Kanbis®




**16%**

De los pacientes utilizó previamente Cannabis y derivados.

## Dosis utilizada (mg/kg/día)

Diagnóstico	Dosis MIN	Dosis MAX	Dosis MED
Epilepsia focal resistente al tratamiento	1	118	13
Epilepsia resistente no especificada	1	71	7
Síndrome de Lennox Gastaut	8	100	24
Crisis parciales migratrices de la infancia	2	15	6
Síndrome de Dravet	7	24	17
Encefalopatía epiléptica con ausencias	2	38	4
Complejo de esclerosis tuberosa	5	5	5
Síndrome de West	2	50	11
Otro	1	67	12

## Tratamiento concomitante



<sup>2</sup> Etosuximida, Rufinamida, Zonisamida, Brivaracetam, Clonazepam, Fenitoína, Gabapentina, Pregabalina.



Los pacientes registrados utilizan entre 1 y 4 fármacos antiepilépticos concomitantemente.


# Una herramienta para el registro de pacientes en tratamiento con Kanbis®.




**1484 pacientes con indicaciones diferentes a epilepsia**




## Edades



## Distribución por sexo



## Condiciones



<sup>3</sup> TOC, burn-out, ELA, esclerosis múltiple, temblor esencial, tolerancia a la quimioterapia y psicosis.

14%

De los pacientes utilizó previamente Cannabis y derivados.




Los pacientes registrados utilizan entre 1 y 7 fármacos concomitantemente.

## Dosis utilizada (mg/día)

Diagnóstico	Dosis MIN	Dosis MÁX	Dosis MED
Dolor crónico	5	2670	25
Trastorno de ansiedad	5	1000	25
Trastornos del sueño	10	3200	30
Depresión	5	3000	25
Trastorno del espectro autista	10	1000	50
Adicciones	5	5000	80
Trastorno por estrés postraumático	5	3600	25
Otras	10	500	35

## Tratamiento concomitante



<sup>4</sup> Los más comunes fueron Lorazepam, Gabapentín, Amitriptilina, Tramadol, Lamotrigina.

+ info



**¡Muchas gracias a todos los que participan en este registro!**

Dirección de Asuntos Médicos / Gerencia de Farmacovigilancia